



Liste et photos des papillons du Maroc

La liste des papillons diurnes du Maroc comporte des lépidoptères rhopalocères de toutes les familles, Papilionidae, Lycaenidae, Pieridae, Nymphalidae et Hesperidae. Merci à Michel TARRIER pour son aimable autorisation à utiliser quelques unes de ses photos, nous vous conseillons d'ailleurs son ouvrage « papillons du Maroc ». Pour avoir plus d'infos et de photos des espèces ci dessous n'hésitez pas à visiter son site internet.

Papilionidae
 Papilioninae
Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) – Proserpine
Iphiclides feisthamelii (Duponchel, 1832) – Voilier blanc
Papilio saharae Oberthür, 1879- Porte-queue éméricole
Papilio machaon Linnaeus, 1758;-Machaon
 Pieridae
 Coliadae
Colias alfacariensis Ribbe, 1905 –Fluoré
Colias croceus (Geoffroy in Fourcroy, 1785) – Souci
Catopsilia florella (Fabricius, 1775) – Piéride du cassier
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Citron
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) – Citron de Provence
Colias alfacariensis Ribbe, 1905 –Fluoré
Colias croceus (Geoffroy in Fourcroy, 1785) – Souci
Catopsilia florella (Fabricius, 1775) – Piéride du cassier
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Citron
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) – Citron de Provence
 Dismorphiinae
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – Piéride de la moutarde
 Pierinae
Aporia crataegi (Linnaeus 1758) – Gazé
Anthocharis belia (Linnaeus, 1767) – Aurore de Barbarie
Colotis evagore Klug, 1829; – Piéride du câprier
Colotis chrysonome (Klug, 1829) rare migrateur
 Euchloe

ausonia (Hübner, [1803-1804]) – Piéride de la roquette *Euchloe belemia* (Esper, 1800) – Piéride du sisymbre *Euchloe charlonia* (Donzel, 1842) – Piéride de la cléome *Euchloe falloui* (Allard, 1867) – Zébré-de-vert *Euchloe tagis* (Hübner, [1803-1804]) – Marbré de Lusitanie *Euchloe tagis* (Hübner, [1803-1804]) – Marbré de Lusitanie *Pieris mannii* (Mayer, 1851) – Piéride de l'Ibéride *Pieris napi* (Linnaeus, 1758) – Piéride du navet *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758) – Piéride de la rave *Pontia daplidice* (Linnaeus, 1908) – Piéride de réséda *Pontia glauconome* (Klug, 1829) – Marbré du désert *Zegris eupheme* Esper, 1805 – Piéride du raifort *Lycaenidae Lycaeninae Lycaena alciphron* (Rottemburg, 1775) – Cuivré mauvin *Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1761) – Cuivré commun *Lycaena phoebus* (Blachier, 1905) – Cuivré de l'Atlas *Theclinae Callophrys avis* Chapman, 1909 – Thècle de l'arbousier *Callophrys avis* Chapman, 1909 – Thècle de l'arbousier *Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758) – Thècle de la ronce *Cigaritis allardi* Oberthür 1909 – Faux-cuivré mauresque *Cigaritis zohra* Donzel, 1847 – Faux-cuivré berbère *Quercusia quercus* (Linnaeus 1758) – Thécla du chêne *Satyrium esculi* (Hübner, 1804) – Thècle du kermès *Tomares ballus* (Fabricius, 1787) – Faux-cuivré smaragdin *Tomares mauretanicus* (Lucas, 1849) – Faux-cuivré du sainfoin *Nymphalidae Charaxinae Charaxes jasius* (Linnaeus, 1767) – Nymphale de l'arbousier *Danainae Danaus plexippus* (Linnaeus, 1758) – Monarque *Danaus chrysippus* (Linnaeus, 1758) – Petit monarque *Heliconiinae Argynnis aglaja* (Linnaeus, 1758) – Grand nacré *Aporia crataegi* (Linnaeus 1758) – Gazé *Argynnis pandora* (Denis & Schiffermüller, 1775) – Cardinal *Boloria dia* (Linnaeus, 1767) – Petite violette *Fabriciana auresiana* (Fruhstorfer, 1908) – Moyen nacré des Atlas *Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758) – Petit nacré *Nymphalinae Cynthia cardui* (Linnaeus, 1758) – Belle-Dame *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775) – Damier de la succise *Euphydryas desfontainii* (Godart, 1819) – Damier des knauties *Melitaea aetherie* Hübner, [1826] – Mélitée andalouse *Melitaea cinxia* (Linnaeus, 1758) – Mélitée du plantain *Melitaea deserticola* Oberthür, 1876 – Mélitée de l'érémiat *Melitaea didyma* (Esper, 1778) – Mélitée orangée *Melitaea phoebe* Denis et Schiffermüller, 1775 – Mélitée des centaures *Mellicta deione* (Geyer, 1832) – Mélitée des linaires *Nymphalis polychloros* – Grande tortue *Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758) – Robert-le-Diable *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758) – Vulcain *Satyrinae Arethusana arethusana* (Denis et Schiffermüller 1775) – Petit agreste *Berberia abdelkader* – (Pierret, 1837) – Grand nègre berbère *Berberia lambessanus* – (Staudinger, 1901) – Grand nègre rifain *Chazara briseis* Linnaeus, 1764 – Hermite. *Chazara prieuri* (Pierret, 1837) – Grand hermite *Coenonympha arcanioides* (Pierret, 1837) – Fadet maghrébin *Coenonympha dorus* Esper, 1782 – Fadet des garrigues *Coenonympha dorus fettigii* Oberthür, 1874 – Fadet de l'Atlas *Coenonympha pamphilus lyllus* (Esper, 1806) – Fadet punique *Coenonympha vaucheri* Blachier 1905 – Fadet marocain *Hipparchia aristaeus* (Bonelli, 1826) – Agreste flamboyant *Hipparchia fidia* Linnaeus, 1767 – Chevron blanc *Hipparchia hansii* (Austaut, 1879) – Fausse-coronide. *Hipparchia powelli* (Oberthür, 1910) – Faune punique. *Hipparchia statilinus* Hufnagel, 1766; – Faune Hyponephele *lupina* (Costa, 1836) – Louvet *Hyponephele maroccana* (Blachier, 1908) – Misis tingitan *Lasiommata maera* (Linnaeus, 1758) – Némusien *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767) – Satyre ou mégère *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758) – Myrtil *Melanargia occitanica* Esper, 1793 – Échiquier de l'Occitanie *Melanargia ines* (Hoffmannsegg, 1804) – Échiquier des Almoravides *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758) – Tircis *Pseudochazara atlantis* (Austaut, 1905) – Ocellé de



l'Atlas *Pyronia bathseba* (Fabricius, 1793) — Ocellé rubané *Pyronia cecilia* (Vallantin, 1894) — Ocellé de la canche *Pyronia tithonus* (Linnaeus, 1758) — *Amaryllis*.
Satyrus ferula atlantea (Fabricius, 1793) — Coronide de l'Atlas *Hesperiidae* *Borbo borbonica* Boisduval, 1833; — Hespérie de l'île Bourbon *Carcharodus flocciferus* (Zeller, 1847) — Hespérie du marrube. *Carcharodus lavatherae* Esper, 1783; — Hespérie de l'épiaire *Carcharodus stauderi* Reverdin, 1913; — Hespérie de Stauder *Carcharodus tripolinus* Verity, 1925; — Hespérie almoravide *Gegenes nostradamus* Fabricius, 1794; — Hespérie du riz *Gegenes pumilio* Hoffmannsegg, 1804; — Hespérie du barbon *Hesperia comma* (Linnaeus, 1758) — Comma *Muschampia leuzeae* (Oberthür, 1881) — Hespérie mauresque. *Muschampia mohammed* (Oberthür, 1887) — Hespérie de Barbarie. *Muschampia proto* Ochsenheimer, 1808; — Hespérie de l'herbe-au-vent *Pyrgus alveus* (Hübner, 1803) — Hespérie du faux-buis *Pyrgus armoricanus* (Oberthür, 1910) — Hespérie des potentilles *Pyrgus onopordi* Rambur, 1839 — Hespérie de la malope *Spialia sertorius* Hoffmannsegg, 1804; — Hespérie des sanguisorbes *Spialia doris* (Walker, 1870) — Hespérie saoudienne *Thymelicus acteon* (Rottemburg, 1775) — Hespérie du chiendent *Thymelicus hamza* Oberthür 1876; — Hespérie maghrébine *Thymelicus lineola* (Ochsenheimer, 1808) — Hespérie du dactyle *Thymelicus sylvestris* (Poda, 1761) — Hespérie de la houque ou Bande noir Source web par ecologie