



La huppe fasciée

La huppe fasciée La huppe fasciée est un oiseau au long bec gracile légèrement arqué. Il a une huppe érectile de plumes roussâtres au bout noir. Son dos est de couleur arlequin teintée de jaunâtre. Sa poitrine est orangée. Son vol est saccadé et bondissant. Huppe fasciée : Oiseau d'une envergure de 45 cm, très facile à identifier grâce à sa huppe et à son très long bec. Son plumage est de couleur chamois orangé, les ailes et la queue sont noirs striés de blanc. Son nid à la réputation de sentir particulièrement mauvais. Ses petits ont la capacité de cracher un liquide malodorant sur d'éventuels prédateurs. Essentiellement insectivore, la huppe capture la grande majorité de ses proies au sol. Diverses espèces d'insectes (scarabées, grillons, fourmis, courtilières, chenilles, larves diverses, etc.) et de petits invertébrés (mille-pattes, limaces, escargots dont elle casse la coquille) figurent à son menu, mais elle recherche spécialement les insectes colonisant les bouses et déjections de mammifères, qu'elle capture avec son long bec recourbé. Il lui arrive aussi de capturer de temps en temps des insectes en vol ou sur ou dans le bois-mort. Elle se nourrit de même de sauterelles, criquets et petits serpents. Les anciens égyptiens le nommaient « Le purificateur d'Egypte ». C'est un oiseau peu farouche mais qui se tient à bonne distance de l'observateur humain. L'habitat type de la huppe, c'est le bocage avec haies vives, bosquets et vergers où elle investit les arbres creux, voire les vieux murs ou les bâtiments abandonnés pour y nicher. Nidification : Elle occupe fréquemment d'anciennes loges de pics, mais se contente



souvent d'une anfractuosit  dont l'ouverture se r duit   une simple fissure. Elle  difie un nid assez simple : nu ou simple amas de d bris v g taux. Ponte : ponte d'avril   juin de 5   7 oeufs gris nuanc s de brun clair et pointill s de blanc ; incubation de 18 jours environ par la femelle seule ravitaill e par le m le. Les poussins s'envolent   3 ou 4 semaines. Apr s l' closion des oeufs, l'accumulation des d jections des poussins r pand une odeur naus abonde, ce qui facilite la d couverte du nid. La Huppe fasci e est migratrice au nord de son aire de r partition, ailleurs elle est soit r sidente soit migratrice. La plupart des nicheurs europ ens hivernent en Afrique au sud du Sahara. La migration, dont une grande partie est nocturne, se produit sur un large front   travers l'Europe et la M diterran e, et probablement aussi   travers le Sahara. La dispersion automnale commence d s la mi-juillet et se poursuit jusqu'  la fin octobre, voire m me en novembre. Les migrants commencent   arriver au sud du Sahara en seconde moiti  du mois d'ao t, le plus gros des arriv s a lieu en septembre &ndash; octobre. Le retour de migration a lieu   partir du d but de f vrier au Maroc et   la Malte, le pic ayant lieu   mi-mars et en avril. Source web par ecologie